

PROCESSO SELETIVO

AVISO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 23/2025

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: **Analista V/ Função: Odontólogo (Mossoró)**

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova.

Tempo total para resolução desta prova: 3 (três) horas.

INSTRUÇÕES

- Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.
- Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova;
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade;
- O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva;
- É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será permitida a entrada de candidatos para execução da prova;
- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas **05 (cinco)** alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**;
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais;
- Responda a prova com **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**;
- Será **eliminado** do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou material de consulta.
- O **Campo de Respostas Oficial** encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como **única** fonte de correção da prova e **não** poderá ser rasurado nem substituído.
- Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer momento, podendo levar apenas a folha de **Conferência do Gabarito** para simples acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado.
- Os últimos 3 (três) candidatos deverão entregar a prova juntos.
- Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início.
- Boa prova!**

ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma

DATA

CAMPO DE RESPOSTAS

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
RESPOSTAS										

1.(COTEC-FADENOR/2024) Acerca da doença periodontal e pacientes diabéticos, avalie as afirmações a seguir.

- I. Diabéticos não controlados têm maior suscetibilidade à periodontite.
- II. Diabéticos mal controlados desenvolvem abscessos periodontais com mais frequência.
- III. Hiperglicemia aumenta inflamação e altera biofilme subgingival.
- IV. Tratamento periodontal não melhora controle sistêmico.

É CORRETO afirmar:

- a) I e III apenas.
- b) I, II e III apenas.
- c) I, II e IV apenas.
- d) II e IV apenas.
- e) III e IV apenas.

2. (ENADE/2023) Pacientes hipertensos atendidos sob estresse odontológico podem apresentar:

- a) Crise hipertensiva.
- b) Hipotensão permanente.
- c) Hipoglicemia.
- d) Vasodilatação excessiva.
- e) Oxidose instantânea.

3. (ENADE/2023) A gravidez é um período de mudanças fisiológicas e psicológicas que interferem diretamente na saúde da gestante. O tratamento odontológico pode ser realizado em qualquer período da gestação, já que os riscos do não tratamento podem ser maiores que os associados à intervenção.

Acerca de tratamento odontológico de paciente em gestação de baixo risco, avalie as afirmações a seguir.

- I. Quando necessária, a solução anestésica mais indicada, em doses controladas, é a lidocaína a 2% com epinefrina na concentração de 1:100 000, sendo o vasoconstritor essencial para a ação hemostática, o aumento da concentração local do anestésico e o prolongamento do seu efeito.
- II. Na indicação de anti-inflamatórios não esteroides (AINES) e de ácido acetilsalicílico (AAS), deve-se ter extremo cuidado, devido à tendência de causarem hemorragias na gestante e no feto, inércia uterina (contração insuficiente do útero durante ou após o parto) e fechamento prematuro dos canais arteriais do feto.

III. Durante a gestação, o tratamento de infecções bucais pode ser realizado com o antibiótico de primeira escolha que é a amoxicilina, visto que ele apresenta ação específica sobre a parede celular bacteriana, com baixo risco à gestante ou ao feto.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) I e III.
- d) I, II e III.
- e) II e III.

4. (ENADE/2023) Tratamento inicial mais indicado para abscesso dental agudo:

- a) Analgésicos e esperar resolução espontânea.
- b) Drenagem e terapia antibiótica.
- c) Só antibiótico.
- d) Monitorar e analgésico.
- e) Extração imediata.

5. (UNESC/2025) Avaliação do risco de cárie em um paciente adolescente orienta o plano de tratamento. O dentista analisa diferentes tipos de cárie para determinar a abordagem clínica adequada. Sobre os tipos de cárie dental, relacione CORRETAMENTE os termos da Coluna A com os exemplos da Coluna B.

Coluna A

- 1. Cárie de esmalte.
- 2. Cárie radicular.
- 3. Cárie secundária.

Coluna B

- () Lesão na superfície de um dente próximo a uma restauração antiga.
- () Lesão superficial na coroa de um molar, sem envolvimento dentinário.
- () Lesão na raiz exposta de um incisivo em paciente idoso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- a) 1, 3, 2.
- b) 3, 1, 2.
- c) 2, 1, 3.
- d) 3, 2, 1.
- e) 2, 3, 1.

6. (INSTITUTO MAIS/2023) As medidas pós-operatórias têm como finalidades a minimização do trauma decorrente do ato operatório em si, como o controle da dor, do edema, da espoliação hídrica iônica e sanguínea, da prevenção de infecção e, principalmente, de favorecer a evolução da ferida cirúrgica e normalização da função regional. Sobre cuidados pós- -operatórios, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

() Fazer compressas com gelo no lado externo nas primeiras 24 horas, durante 20 minutos e descansar 20 minutos.

() O uso inicial de uma alimentação mais branda e fria, além de permitir repouso local da ferida cirúrgica, minimiza o sangramento pós-operatório natural e, conseqüentemente, diminui a probabilidade de quadros hemorrágicos se instalarem. Geralmente recomenda-se por um período mínimo de 48 horas.

() A escovação deve ser evitada nos primeiros dias, utilizando-se apenas de bochechos intensos na região operada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- a) F / V / V.
- b) V / F / V.
- c) F / V / F.
- d) V / V / F.
- e) F / F / V.

7. (VUNESP/2024) Na proteção do complexo dentina-polpa para cavidades rasas e médias, pode-se lançar mão da técnica de hibridização que consiste em:

- a) aplicar camada fina de óxido de zinco e eugenol sobre a câmara pulpar.
- b) aplicar uma camada de cimento de hidróxido de cálcio seguido de preenchimento da cavidade com cimento de ionômero de vidro.
- c) forrar o fundo da cavidade com agregado trióxido mineral (MTA).
- d) uso de condicionamento ácido e sistemas adesivos.
- e) uso de pó de hidróxido de cálcio seguido de cimento de hidróxido de cálcio fotoativado.

8. (ENADE-2019) O clareamento dental, procedimento mais realizado na área de odontologia estética, é seguro, quando corretamente indicado e executado, e não invasivo. O cirurgião-dentista deve ter conhecimento científico para executar a técnica adequada e indicar a concentração ideal do produto clareador, a fim de evitar os efeitos adversos, como a sensibilidade dental e a irritação gengival.

MARSON, F. et al. Clareamento Dental. In: REIS, R.; MARSON, F. Materiais dentários em odontologia restauradora estética e contemporânea. São Paulo: Quintessence, 2019 (adaptado).

A respeito do clareamento dental, avalie as afirmações a seguir.

- I. A difusão do peróxido de hidrogênio pelas estruturas de esmalte e dentina propicia sua chegada até o tecido pulpar, dependendo do volume de tecido mineralizado e de sua permeabilidade, da concentração do gel clareador e do tempo de aplicação.
- II. O clareamento caseiro supervisionado envolve menor risco e menor intensidade de sensibilidade do que o clareamento de consultório, no qual é utilizada maior concentração de géis.
- III. As substâncias como a sílica, a alumina e o fosfato dicálcio di-hidratado, presentes nos dentifrícios clareadores, promovem a remoção de manchas extrínsecas pelo mecanismo de abrasão.
- IV. O pincel clareador à base de peróxido de hidrogênio ou de carbamida em suspensão produz efeito clareador satisfatório, com resultados superiores aos das tiras de clareamento.
- V. O clareamento em áreas com lesões incipientes de cáries aumenta a suscetibilidade ao desenvolvimento dessas lesões.

É CORRETO apenas o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, IV e V.
- d) II, III e V.
- e) III, IV e V.

9. (FUNCAB-SESC-BA/2013) Segundo Conceição (2007), a lesão de cárie que se apresenta clinicamente opaca, rugosa, encontrada preferencialmente em locais de maior dificuldade de limpeza, podendo estar associada à gengivite é:

- a) inativa com cavitação.
- b) inativa.
- c) ativa com cavitação.
- d) ativa.
- e) mista.

10. (QUADRIX-SESC-DF/2018) A participação do dentista na prevenção da endocardite infecciosa é muito importante. Diversas associações de renome internacional têm se preocupado com o assunto, como a AHA (*American Heart Association*), que possui uma comissão que inclui representantes da ADA (*American Dental Association*), que se reúne periodicamente para elaborar recomendações para a prevenção da endocardite infecciosa, direcionadas a médicos e cirurgiões-dentistas. Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O regime-padrão para prevenção da endocardite infecciosa, recomendado pela AHA, para adultos é de 2 g de amoxicilina, que devem ser ingeridos de trinta a sessenta minutos antes do procedimento odontológico. Para crianças, deve ser feito o cálculo de 50 mg por kg de peso do paciente. A dose deve ser única e ingerida de trinta a sessenta minutos antes do procedimento.
- b) O regime-padrão para prevenção da endocardite infecciosa, recomendado pela AHA, para adultos é de 2 g de amoxicilina, que devem ser ingeridos de trinta a sessenta minutos antes do procedimento odontológico. Após oito horas da ingestão da medicação, a dose deverá ser repetida. Para crianças, deve ser feito o cálculo de 50 mg por kg de peso do paciente. A dose deve ser única e ingerida de trinta a sessenta minutos antes do procedimento. Após oito horas da ingestão da medicação, a dose deverá ser repetida.
- c) O regime-padrão para prevenção da endocardite infecciosa, recomendado pela AHA, para adultos é de 2 g de amoxicilina, que devem ser ingeridos de oito em oito horas, no dia do procedimento odontológico. Para crianças, deve ser feito o cálculo de 50 mg por kg de peso do paciente e administrada, de oito em oito horas, no dia do procedimento odontológico.
- d) O regime-padrão para prevenção da endocardite infecciosa, recomendado pela AHA, para adultos é de 1 g de amoxicilina, que deve ser ingerido de trinta a sessenta minutos antes do procedimento odontológico. Para crianças, deve ser feito o cálculo de 100 mg por kg de peso do paciente. A dose deve ser única e ingerida de trinta a sessenta minutos antes do procedimento.
- e) O regime-padrão para prevenção da endocardite infecciosa, recomendado pela AHA, para adultos é de 2 g de amoxicilina, de oito em oito horas, durante sete dias. Para crianças, deve ser feito o cálculo de 50 mg por kg de peso do paciente. A dose deverá ser realizada, de oito em oito horas, durante sete dias.

QUESTÃO DISCURSIVA

ATENÇÃO! SOMENTE A FOLHA OFICIAL SERÁ CORRIGIDA

1.(Adaptação ENADE-2016) Um homem com 61 anos de idade, leucoderma, trabalhador rural, compareceu à Unidade de Saúde com queixa principal de “ferida no lábio que não melhora há mais de dois meses”. Ao exame físico, verificou-se lesão no lábio inferior, conforme imagem abaixo.



Silva, FS; França, MMC, 2021

A partir deste caso descrito acima, escreva um texto dissertativo, com número mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas, contemplando os tópicos abaixo descritos:

- a) Quais os aspectos da anamnese que contribuiriam para estabelecer as hipóteses diagnósticas.
- b) Apresente duas hipóteses diagnósticas para o caso.
- c) Cite e justifique duas condutas clínicas iniciais do cirurgião-dentista adequadas para o caso.

FOLHA OFICIAL

QUESTÃO 01 DISCURSIVA

ATENÇÃO! SOMENTE A FOLHA OFICIAL SERÁ CORRIGIDA!

- Não deve conter rasuras;

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

PROCESSO SELETIVO

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Analista V/ Função: Odontólogo (Mossoró)

Atenção Candidato,

- Esse é o anexo de **CONFERÊNCIA DO GABARITO**. Ele não tem validade oficial para o certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar do Sesc/RN.
- Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme **CAMPO DE RESPOSTAS OFICIAL**.
- Certifique-se de estarem idênticos.
- Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova realizada.
- Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo”.
- Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais etapas.
- **Boa prova!**

CAMPO DE RESPOSTAS – CANDIDATO

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
RESPOSTAS										

Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização para qualquer outro fim.

Essa folha poderá ser levada com o candidato